

## 悪性神経膠腫登録療法

	療法名	適応
1	Bi-weekly アバスチン+TMZ療法	悪性神経膠腫

①療法名 Bi-weekly アバスチン+TMZ療法(維持療法)



②適応 悪性神経膠腫(初発)

③使用薬剤 アバスチン、テモダール

④用量	アバスチン	10mg/kg (7コース目以降はアバスチン15mg/kg3週毎へ)
	テモダール	150~200mg/m <sup>2</sup>


⑤スケジュール

アバスチン2週間毎、テモダール1~5日目4週間毎、1クール28日



・アバスチンの投与時間は初回認容性良好であれば2回目は60分、3回目は30分に短縮可能。

- ①療法名 Bi-weekly アバスチン+TMZ療法(維持療法)
- ②適応 悪性神経膠腫(初発)
- ③使用薬剤と用量 アバスチン 10mg/kg day1・15  
 テモダール150~200mg/m2  
 day1~5 1日1回
- ④スケジュール 4週間1クール 上限6クール



⑤レジメン詳細

① day1

- |                                        |
|----------------------------------------|
| ① パロノセトロン0.75mg<br>デキサート6.6mg 点滴 15min |
| ② アバスチン10mg/kg<br>生食100mL 点滴 30~90min  |
| ③ テモダール150~200mg/m2<br>1日1回 5日間内服      |

② day15

- |                                       |
|---------------------------------------|
| ① アバスチン10mg/kg<br>生食100mL 点滴 30~90min |
|---------------------------------------|