

## 胃癌登録療法

	療法名	適応
1	TS1+CDDP療法	胃癌
2	G-SOX療法	胃癌
3	weeklyPTX+ラムシルマブ療法	胃癌
4	weeklyPTX療法	胃癌
5	CPT11療法(4投2休)	胃癌
6	TS1+DTX療法	胃癌
7	TS1+weeklyPTX療法	胃癌
8	nab-PTX療法	胃癌
9	HER+XP療法	胃癌
10	5-FU+weeklyPTX療法	胃癌
11	TS-1+CPT-11療法	胃癌
12	CPT11療法(2週1回投与)	胃癌
13	XEROX	胃癌
14	HER+SOX療法	胃癌
15	ニボルマブ療法	胃癌
16	DTX単独療法	胃癌
17	RAM+nab-PTX療法	胃癌
18	オブジーボ+SOX療法	胃癌

- ①療法名 TS1+CDDP療法
- ②適応 胃癌
- ③使用薬剤 TS1(20・25)、シスプラチン


④用量

TS1	80mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>

⑤用法 TS1:分2(PO)

⑥スケジュール


3週投薬2週休薬で1クール




Day 7



Day 8



Day 9




- ①療法名 G-SOX療法
- ②適応 胃癌
- ③使用薬剤 TS-1 (20・25)、エルプラット
- ④用量

TS-1	80mg/m <sup>2</sup>
エルプラット	100mg/m <sup>2</sup>

- ⑤用法 TS-1:分2(PO)  
14日間投与7日間休薬(Day1の夕食後より開始)

- ⑥スケジュール

3週毎に投与




- ①療法名 weekly PTX+ラムシルマブ療法
- ②適応 胃癌
- ③使用薬剤 パクリタキセル、サイラムザ
- ④用量
 


パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>
サイラムザ	8mg/kg

⑤スケジュール


**週1回、3週連続、1週休薬を1クールとして反復**



Day1,15



Day8



①療法名 weeklyPTX単独療法


②適応 胃癌

③使用薬剤 パクリタキセル

④用量 パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup>

⑤スケジュール

週1回、3週連続、1週休薬を1クールとして反復



① デカドロン 16.5mg、生食 20mL IV

② ガスター 20mg、生食20mL IV


③ レスタミンコーワ錠10mg 5錠 PO

④ パクリタキセル 80mg/m<sup>2</sup>  
5%TZ 250mL  
60min DIV

30分  
後と ※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること

- ①療法名 CPT-11療法
- ②適応 胃癌
- ③使用薬剤 イリノテカン
- ④用量 イリノテカン 100mg/m<sup>2</sup>
- ⑤スケジュール

週1回、4週連続、2週休薬を1クールとして反復



4日前から 1) エリーテン・ウルソ(100) 各3錠 分3 PO  
 重曹1.8g 分3(食間) PO  
 酸化マグネシウム 2.0g 分3 PO  
 アルカリ飲料水 1.5L/日 飲用

当日 2) グラニセトロン 1P IV  
 3) イリノテカン 100mg/m<sup>2</sup>  
 生食 500mL/2hr DIV

①療法名 TS-1+DTX療法

②適応 胃癌


③使用薬剤 TS-1(20・25)、ドセタキセル

④用量	TS-1	80mg/m <sup>2</sup>
	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>

⑤用法 TS-1 1日2回 経口(2週間内服、1週間休薬)

⑥スケジュール

3週で1クール



①グラニセトロン又はアロキシバグ 1P  
デカドロン6.6mg 1V  
15min IV

15分後 ② ドセタキセル 40mg/m<sup>2</sup>  
5%ブドウ糖液 250mL  
90min IV

①療法名 TS-1+weekly PTX療法

②適応 胃癌



③使用薬剤 TS-1 (20・25)、パクリタキセル

④用量	TS-1	80mg/m <sup>2</sup>
	パクリタキセル	50mg/m <sup>2</sup>

⑤用法 TS-1 1日2回 経口 (2週間内服、1週間休薬)

⑥スケジュール

2週投薬1週休薬で1クール






①療法名 アブラキサン単独療法(3週毎)

②適応 胃癌

③使用薬剤 アブラキサン

④用量 アブラキサン 260mg/m<sup>2</sup>

⑤スケジュール



① グラニセトロン又はアロキシバッグ  
1P  
デカドロン6.6mg 15min DIV

② アブラキサン 260mg/m<sup>2</sup>  
生食 適量※ 30min DIV

※ アブラキサン100mg/V当たり生食20mLで懸濁後、  
必要投与量のみ使用。希釈禁止。

15分後

①療法名 ハーセプチン+XP療法

②適応 胃癌


③使用薬剤 ゼローダ、ハーセプチン、シスプラチン

④用量	ゼローダ	2000mg/m <sup>2</sup> /日
	ハーセプチン(初回)	8mg/kg
	ハーセプチン(2回目以降)	6mg/kg
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>


⑤用法 ゼローダ:分2(PO) 点滴当日夕食後から服用開始(2週間)

⑥スケジュール

3週毎に施行




① (初回)



・点滴終了後 夕食後より ゼローダ 2000mg/m<sup>2</sup> /2×N/14日 服用開始。  
その後、1週間休薬。

② (2回目以降)



・点滴終了後 夕食後より ゼローダ 2000mg/m<sup>2</sup> /2×N/14日 服用開始。  
その後、1週間休薬。

①療法名 5-FU+weeklyPTX


②適応 胃癌

③使用薬剤 5-FU、パクリタキセル


④用量	5-FU	600mg/m <sup>2</sup> /day
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール


4週で1クール



Day1-5



Day8、15、22



前投薬として、レスタミンコーワ錠10mg×5Tab(内服)、ガスター注20mg+生食20mL

①療法名 TS-1+CPT-11療法



②適応 胃癌

③使用薬剤 TS-1 (20・25)、イリノテカン

④用量	TS-1	80mg (BSA < 1.25m <sup>2</sup> )
		100mg (1.25m <sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5m <sup>2</sup> )
		120mg (BSA ≥ 1.5m <sup>2</sup> )
	イリノテカン	80mg/m <sup>2</sup>

⑤用法 TS-1 1日2回 経口 (3週間内服、2週間休薬)

⑥スケジュール



①療法名 CPT11療法



②適応 胃癌

③使用薬剤 イリノテカン

④用量	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>
-----	--------	----------------------

⑤スケジュール

2週1回投与



内服: デカドロン8mg/day (day2,3) イメンドカプセルday1~3

①療法名 XELOX療法

②適応 胃癌


③使用薬剤 ゼローダ、エルプラット

④用量	ゼローダ	2000mg/m <sup>2</sup> /日
	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>


⑤用法 ゼローダ:分2(PO)点滴当日夕食後から服用開始  
(2週間)

⑥スケジュール

3週毎に施行



1クール



・点滴終了後 夕食後より ゼローダ 2000mg/m<sup>2</sup> /2×N/14日 服用開始。


- ①療法名 ハーセプチン+SOX療法  
 ②適応 胃癌  
 ③使用薬剤 TS-1(20・25)、ハーセプチン、エルプラット  
 ④用量

TS-1	80mg~120mg/m <sup>2</sup> /日
ハーセプチン(初回)	8mg/kg
ハーセプチン(2回目以降)	6mg/kg
エルプラット	100mg/m <sup>2</sup>

- ⑤用法 TS-1:分2(PO) 点滴当日夕食後から服用開始(2週間)

- ⑥スケジュール

3週毎に施行



1クール


- ①(初回)



Day2,3 デカドロン錠0.5mg 16錠/2×朝昼

- ・点滴終了後 夕食後より TS-1 80mg~120/m<sup>2</sup> /2×N/14日 服用開始。  
 その後、1週間休薬。

- ②(2回目以降)



Day2,3 デカドロン錠0.5mg 16錠/2×朝昼

- ・点滴終了後 夕食後より TS-1 80mg~120/m<sup>2</sup> /2×N/14日 服用開始。  
 その後、1週間休薬。

①療法名 オプジーボ療法



②適応 胃癌

③使用薬剤 オプジーボ

④用量 オプジーボ 240mg/body

⑤スケジュール

2週間毎に施行





①療法名 ドセタキセル単独療法



②適応 胃癌

③使用薬剤 ドセタキセル

④用量 ドセタキセル 60mg/m<sup>2</sup>

⑤スケジュール

3週を1コース




Day2,3 デカドロン錠0.5mg 16錠/2×朝昼

- ①療法名 RAM+wnab-PTX療法
- ②適応 胃癌
- ③使用薬剤 アブラキサン、サイラムザ


④用量	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>
	サイラムザ	8mg/kg

⑤スケジュール


**週1回、3週連続、1週休薬を1クールとして反復**



Day1,15



Day8



- ①療法名 オプジーボ+SOX療法
- ②適応 胃癌
- ③使用薬剤 TS-1 (20・25)、エルプラット、オプジーボ
- ④用量

TS-1	80mg/m <sup>2</sup>
エルプラット	100mg/m <sup>2</sup>
オプジーボ	360mg/body

- ⑤用法 TS-1:分2(PO)  
14日間投与7日間休薬(Day1の夕食後より開始)

- ⑥スケジュール

3週毎に投与

