

子宮頸癌登録療法

| | 療法名 | 適応 |
|---|---------------|-----------|
| 1 | シスプラチン療法(1日法) | 子宮頸癌 頸部腺癌 |
| 2 | TC療法 | 子宮頸癌 |

①療法名 シスプラチン療法(1日法)

②適応 子宮頸癌 頸部腺癌



③使用薬剤 シスプラチン

④用量

| | |
|--------|---------------------|
| シスプラチン | 70mg/m ² |
|--------|---------------------|

⑤スケジュール

3~4週を1クール計4~6クール



ソルアセトF 500mL

ビカネイト 500mL×4

①グラニセロンバッグまたはアロキシバッグ1P
デカドロン19.8mg
15min IV 側注

15分
後

②生食 500mL
シスプラチン 70mg/m²
120min IV側注

135
分後

③生食100mL
フロセミド10mg
30min IV側注

【参考】ハイドレーション

| | |
|-----|---|
| 前日 | ビカネイト 500mL×4 |
| 2日目 | ビカネイト 500mL×2 ソルアセトF 500mL×2 生食50mL+デカドロン6.6mg 側管 |
| 3日目 | 生食50mL+デカドロン6.6mg 側管 終了抜針 |

①療法名 TC 療法(入院)

②適応 子宮頸癌


③使用薬剤 パクリタキセル、カルボプラチン

④用量

| | |
|---------|--------------------------|
| パクリタキセル | 175~180mg/m ² |
| カルボプラチン | target AUC=5~6 |

⑤スケジュール

3~4週間毎に施行



前日20:00~ ① 生食50mL→へパリンNaロック

当日9:00~ ② ソルアセトF500mL
360min IV

360分後
当日9:30~ ③ アロキシバック 1P
デキサート 13.2mg
ポララミン 5mg
ファモチジン 20mg
30min IV

390分後
当日10:00~ ④ 生食 500mL
パクリタキセル 175~180mg/m²
180min IV
※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること

570分後
当日13:00~ ⑤ 生食 250mL
カルボプラチン targetAUC=5~6
60min IV

630分後
当日14:00~ ④ 生食 100mL
塩酸メトクロプラミド10mg
30min IV

☆イメンドを併用しない場合はデカドロン注射液は16.5mgへ増量可。

①療法名 TC 療法(外来)

②適応 子宮頸癌


③使用薬剤 パクリタキセル、カルボプラチン

④用量
パクリタキセル 175~180mg/m²

カルボプラチン target AUC=5~6

⑤スケジュール

3~4週間毎に施行



① アロキシバック 1P
デキサート 13.2mg
ポララミン5mg
ファモチジン 20mg
30min IV

② 生食 500mL
パクリタキセル 175~180mg/m²
180min IV
※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること

③ 生食 250mL
カルボプラチン targetAUC=5~6
60min IV

④ 生食 100mL
塩酸メクロプラミド10mg
30min IV

☆イメンドを併用しない場合はデカドロン注射液は16.5mgへ増量可。