

## 腎癌登録療法

	療法名	適応
1	トーリセル療法	腎細胞癌
2	オプジーボ療法	腎細胞癌
3	オプジーボ+ヤーボイ療法	腎細胞癌
4	キイトルーダ+アキシチニブ併用療法	腎細胞癌
5	バベンチオ+アキシチニブ併用療法	腎細胞癌
6	キイトルーダ+レンバチニブ併用療法	腎細胞癌
7	オプジーボ+カボザンチニブ併用療法	腎細胞癌
8	キイトルーダ療法(adjuvant)	腎細胞癌

①療法名 トーリセル療法


②適応 腎癌

③使用薬剤 トーリセル

④用量 トーリセル 25mg/BODY

⑤スケジュール

1週間毎に施行



① トーリセル 25mg/body  
生食 500mL  
IV 120min

※インラインフィルター(5 $\mu$ m以下)を使用すること

①療法名 オプジーボ療法


②適応 腎癌

③使用薬剤 オプジーボ

④用量 オプジーボ 240mg/body

⑤スケジュール

2週間毎に施行



①療法名 オプジーボ+ヤーボイ療法

②適応 腎癌

③使用薬剤 オプジーボ・ヤーボイ


④用量

オプジーボ	240mg/body
-------	------------


ヤーボイ	1mg/kg
------	--------

⑤スケジュール


3週間毎に4コース施行後、オプジーボ単独で2週毎に施行



①1~4コース目



②5コース目以降




①療法名 キイトルーダ+アキシチニブ併用療法

②適応 腎細胞癌

③使用薬剤と用量	キイトルーダ 200mg/body
	インライタ錠 1回5mg(適宜増減1回10mgまで) 1日2回 連日

④スケジュール 3週間1クール




⑤レジメン詳細

① キイトルーダ 200mg 生食 100mL 点滴 30min ※インラインフィルター(0.2~5 $\mu$ m)使用
---

② インライタ錠 1日2回 連日
------------------

- ①療法名 バベンチオ+アキシチニブ療法
- ②適応 腎細胞癌
- ③使用薬剤と用量 バベンチオ 10mg/kg  
インライタ錠  
1回5mg(適宜増減1回10mgまで)  
1日2回 連日
- ④スケジュール 2週間1クール



⑤レジメン詳細


① アセトアミノフェン錠200mg 5T内服

② ポララミン注 5mg  
生食 50mL  
点滴 30min

③ バベンチオ 10mg/kg  
生食 250mL  
点滴 60min ※インラインフィルター(0.2~5 $\mu$ m)使用

④ インライタ錠 1日2回 連日

- ①療法名 キイトルーダ+レンバチニブ療法
- ②適応 腎細胞癌
- ③使用薬剤と用量 キイトルーダ 200mg/body  
レンビマカプセル  
1回20mg(適宜減量1回4mgまで)  
1日1回 連日
- ④スケジュール 3週間1クール




⑤レジメン詳細

① キイトルーダ 200mg/kg  
生食 100mL  
点滴 30min ※インラインフィルター(0.2~5 $\mu$ m)使用

② レンビマカプセル 1日1回 連日

- ①療法名 オプジーボ+カボザンチニブ療法
- ②適応 腎細胞癌
- ③使用薬剤と用量 オプジーボ 240mg/body  
カボメティクス錠  
1回40mg(適宜減量1回20mg隔日まで)  
1日1回 空腹時 連日
- ④スケジュール 2週間1クール



⑤レジメン詳細


① オプジーボ 240mg/kg  
生食 100mL 点滴 30min  
※インラインフィルター(0.2~5 $\mu$ m)使用

② 生食 100mL(フラッシュ用) 点滴 30min

③ カボメティクス錠 1日1回 空腹時 連日



- ①療法名 キイトルーダ  
②適応 腎細胞癌（術後補助化学療法）  
③使用薬剤と用量 キイトルーダ 200mg/body  
④スケジュール 3週間1クール 1年間または17クールまで



⑤レジメン詳細

- ① キイトルーダ 200mg/kg  
生食 100mL  
点滴 30min ※インラインフィルター(0.2~5 $\mu$ m)使用