

## 大腸癌登録療法


	療法名	適応
1	FOLFOX4療法	大腸癌
2	FOLFOX4+BV療法	大腸癌
3	FOLFOX4+VCT療法	大腸癌
4	I-LV+5FU療法	大腸癌
5	mFOLFOX6療法	大腸癌
6	mFOLFOX6+BV療法	大腸癌
7	mFOLFOX6+VCT療法	大腸癌
8	FOLFIRI療法 (入院)	大腸癌
9	FOLFIRI療法 (外来)	大腸癌
10	FOLFIRI+BV (入院)	大腸癌
11	FOLFIRI+BV (外来)	大腸癌
12	FOLFIRI+VCT (入院)	大腸癌
13	FOLFIRI+VCT (外来)	大腸癌
14	IFL療法	大腸癌
15	IFL+BV療法	大腸癌
16	Cetu+CPT11療法	大腸癌
17	XELOX療法	大腸癌
18	XELOX+BV療法	大腸癌
19	VCT療法	大腸癌
20	VCT+CPT11療法	大腸癌
21	IRIS療法	大腸癌
22	IRIS+BV療法	大腸癌
23	SOX療法	大腸癌
24	SOX+BV療法	大腸癌
25	Cetu単独療法	大腸癌
26	FOLFIRI+AFL療法	大腸癌
27	TAS-102(FTD/TPI)+BV療法	大腸癌
28	UFT+LV+BV療法	大腸癌
26	SIRB療法	大腸癌
27	IRIS+VCT療法	大腸癌

- ①療法名 FOLFOX4療法  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、エルプラット、5-FU  
 ④用量


レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	800mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	1200mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール


2週毎に施行



Day1



Day2




- ①療法名 FOLFOX4+BV療法  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、エルプラット、5-FU、アバスチン  
 ④用量


レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	800mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	1200mg/m <sup>2</sup>
アバスチン	5mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行



Day1



アバスチンの投与時間は初回認容性良好であれば2回目は60分、3回目は30分に短縮可能。

Day2



- |  |
|--|
| ① グラニセトロンバック 1P<br>デカドロン6.6mg 15minIV                |
| ② レボホリナート 100mg/m <sup>2</sup><br>5%TZ 250mL 2hr DIV |

- |           |   |
|-----------|---|
| 120<br>分後 | ④ 5-FU 400mg/m <sup>2</sup> IV<br>生食 50mL 30min           |
| 120<br>分後 | ⑤ 5-FU 600mg/m <sup>2</sup><br>ソルデム3A等 1000mL<br>22時間持続静注 |


- ①療法名 FOLFOX4+VCT療法  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、エルプラット、5-FU、ベクティビックス

④用量


レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>
5-FU(急速静注)	800mg/m <sup>2</sup>
5-FU(持続静注)	1200mg/m <sup>2</sup>
ベクティビックス	6mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行




Day1



ベクティビックスの1回投与量として1000 mgを越える場合は、生食を添加して全量を約150 mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。

Day2



①療法名 1-LV+5FU療法



②適応 大腸癌

③使用薬剤 レボホリナート、5-FU

④用量	レボホリナート	250mg/m <sup>2</sup>
	5-FU	600mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール

週1回 6週連続2週休薬



①療法名 mFOLFOX6療法

②適応 大腸癌


③使用薬剤 レボホリナート、エルプラット、5-FU

④用量

レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール

2週毎に施行



②カイトリル 1P  
デカドロロン 6.6mg  
IV 15min

③-1 レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup>  
5%TZ 250mL  
120min IV(エルプラットと並列で)

15分後

③-2 エルプラット 85mg/m<sup>2</sup>  
5%TZ 250mL  
120min IV(レボホリナートと並列で)

④ 5-FU 400mg/m<sup>2</sup>  
生食 50mL  
225分後 (全開で)

⑤ 5-FU 2400mg/m<sup>2</sup> +生食適量  
(全量を96mLとする)  
インフューザーポンプ(2mL/hr)使用

④終了後 46時間を目標に持続




- ①療法名 mFOLFOX6+BV療法  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、エルプラット、5-FU  
 ④用量

レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>
アバスチン	5mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行



① カイトリル又はアロキシバッグ 1P  
 デカドロン 6.6mg  
 IV 15min

15分  
後  
② アバスチン5mg/kg  
 生食 100mL  
 30~90min IV

③-1 レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup>  
 5%TZ 250mL  
 DIV 2hr(エルプラットと並列で)

105  
分後  
③-2 エルプラット 85mg/m<sup>2</sup>  
 5%TZ 250mL  
 DIV 2hr(レボホリナートと並列で)

225  
④ 5-FU 400mg/m<sup>2</sup>  
 生食 50mL  
 (全開で)

④終  
了後  
⑤ 5-FU 2400mg/m<sup>2</sup> +生食適量  
 (全量を96mLとする)  
 インフューザーポンプ(2mL/hr)使用  
 46時間を目標に持続


アバスチンの投与時間は初回認容性良好であれば2回目は60分、3回目は30分に短縮可能。

- ①療法名 mFOLFOX6+VCT療法  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、エルプラット、5-FU、ベクティビックス  
 ④用量

レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>
ベクティビックス	6mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行




ベクティビックスの1回投与量として1000 mgを越える場合は、生食を添加して全量を約150 mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。

- ①療法名 FOLFIRI療法(入院)
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 レボホリナート、イリノテカン、5-FU


④用量	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>
	5-FU (急速静注)	800mg/m <sup>2</sup>
	5-FU (持続静注)	1200mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール


2週毎に施行




Day1



Day2



- ①療法名 FOLFIRI療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤と用量  
 レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup>  
 イリノテカン 150mg/m<sup>2</sup>  
 5-FU(急速) 400mg/m<sup>2</sup>  
 5-FU(持続) 2400mg/m<sup>2</sup>
- ④スケジュール 2週間1クール



⑤レジメン詳細

① パロノセトロン 0.75mg  
 デキサート 6.6mg  
 IV 15min

②-1 レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup>  
 5%糖液 250mL  
 IV 120min

②-2 イリノテカン 150mg/m<sup>2</sup>  
 5%糖液 250mL  
 IV 120min

③ 5-FU 400mg/m<sup>2</sup>  
 生食 50mL  
 IV 全開


④ 5-FU 2400mg/m<sup>2</sup>  
 生食 全量を96mLに調製  
 IV 46Hr ※インフューザーポンプ使用

- ①療法名 FOLFIRI+BV療法(入院)  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、イリノテカン、5-FU、アバスチン  
 ④用量


レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	800mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	1200mg/m <sup>2</sup>
アバスチン	5mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行




Day1



アバスチンの投与時間は初回認容性良好であれば2回目は60分、3回目は30分に短縮可能。

Day2





- ①療法名 FOLFIRI+BV療法(外来)  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、イリノテカン、5-FU、アバスチン  
 ④用量

レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>
アバスチン	5mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行



アバスチンの投与時間は初回認容性良好であれば2回目は60分、3回目は30分に短縮可能。




- ①療法名 FOLFIRI+VCT療法(入院)  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、イリノテカン、5-FU、ベクティビックス  
 ④用量


レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	800mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	1200mg/m <sup>2</sup>
ベクティビックス	6mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行




Day1



ベクティビックスの1回投与量として1000 mgを越える場合は、生食を添加して全量を約150 mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。

Day2





①療法名 FOLFIRI+VCT療法(外来)



②適応 大腸癌

③使用薬剤 レボホリナート、イリノテカン、5-FU、ベクティビックス

④用量	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>
	5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>
	5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>
	ベクティビックス	6mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行



ベクティビックスの1回投与量として1000 mgを越える場合は、生食を添加して全量を約150 mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。

- ①療法名 IFL療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 レボホリナート、5-FU、イリノテカン



④用量

レボホリナート	20mg/m <sup>2</sup>
5-FU	500mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール

4週連続投与2週休薬で1クール

→ IFL投与  
(イリノテカン、5-FU、レボホリナート)



①療法名 IFL+BV療法

②診療科名 大腸癌


③使用薬剤 レボホリナート、5-FU、イリノテカン、アバスチン

④用量	レボホリナート	20mg/m <sup>2</sup>
	5-FU	500mg/m <sup>2</sup>
	イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>
	アバスチン	5mg/kg

⑤スケジュール

IFL:4週投薬2週休薬、BV:隔週投薬 6週で1クール

→ IFL投与 (イリノテカン、5-FU、レボホリナート)      ...▶ アバスチン投与



① イリノテカン 125mg/m<sup>2</sup>  
5%TZ 250mL 90min IV

90分後 ② 5-FU 500mg/m<sup>2</sup> IV  
生食 50mL 急速静注

②終了後 ③ レボホリナート 20mg/m<sup>2</sup>  
生食 50mL 急速静注

③終了後 ④アバスチン5mg/kg  
生食 100mL  
90min IV

①療法名 アービタックス+CPT11療法


②適応 大腸癌

③使用薬剤 アービタックス、CPT11




④用量	アービタックス	初回のDAY1 400mg/m <sup>2</sup> 以降250mg/m <sup>2</sup>
	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール

週1回、4回で1クール



1サイクル目 初回投与  
2サイクル目以降 1クール





- ①療法名 XELOX療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 ゼローダ、エルプラット

④用量	ゼローダ	2000mg/m <sup>2</sup> /日
	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>

- ⑤用法 ゼローダ:分2(PO)点滴当日夕食後から服用開始  
(2週間)

- ⑥スケジュール

3週毎に施行



・点滴終了後 夕食後より ゼローダ 2000mg/m<sup>2</sup> /2×N/14日 服用開始。


- ①療法名 XELOX+BV療法  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 ゼローダ、アバスチン、エルプラット  
 ④用量

ゼローダ	2000mg/m <sup>2</sup> /日
エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>
アバスチン	7.5mg/kg


- ⑤用法 ゼローダ:分2(PO) 点滴当日夕食後から服用開始  
 (2週間)

- ⑥スケジュール

3週毎に施行



1クール



・アバスチンの投与時間は初回認容性良好であれば2回目は60分、3回目は30分に短縮可能。

・点滴終了後 夕食後より ゼローダ 2000mg/m<sup>2</sup> /2×N/14日 服用開始。

①療法名 VCT単独療法

②適応 大腸癌


③使用薬剤 ベクティビックス

④用量 

ベクティビックス	6mg/kg
----------	--------

⑤スケジュール

2週毎に施行



① ベクティビックス6mg/kg  
生食 100mL 60min DIV  
※インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用すること

60分  
後 ② 生食 100mL 60min DIV  
※※全身状態(Infusion reaction)の  
観察のため


ベクティビックスの1回投与量として1000 mgを越える場合は、生食を添加して全量を約150 mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。

- ①療法名 VCT+CPT-11療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 ベクティビックス、イリノテカン

④用量	ベクティビックス	6mg/kg
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール

2週1回



ベクティビックスの1回投与量として1000 mgを越える場合は、生食を添加して全量を約150 mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。



- ①療法名 IRIS療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 TS-1 (20・25)、イリノテカン


④用量

TS-1	40～60mg/回
イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>


⑤用法 TS-1:分2(PO)

⑥スケジュール

TS-1:2週投薬2週休薬 イリノテカン:2週毎 4週で1クール



Day 1,15




- ①療法名 IRIS+BV療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 TS-1(20・25)、イリノテカン、アバスチン

④用量	アバスチン	5mg/kg
	TS-1	40~60mg/回
	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>


⑤用法 TS-1:分2(PO)

⑥スケジュール

TS-1:2週投薬2週休薬 イリノテカン:2週毎 4週で1クール



Day 1,15




- ①療法名 SOX療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 TS-1 (20・25)、エルプラット

④用量	TS-1	80～120mg/day
	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>


- ⑤用法 TS-1:分2(PO)  
14日間投与7日間休薬(Day1の夕食後より開始)

⑥スケジュール

3週毎に投与



Day1



Day2,3 デカドロン錠0.5mg 16錠/2×朝昼


- ①療法名 SOX+BV療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 TS-1 (20・25)、エルプラット、アバスチン

④用量	TS-1	80～120mg/day
	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>
	アバスチン	7.5mg/kg


- ⑤用法 TS-1:分2(PO)  
14日間投与7日間休薬(Day1の夕食後より開始)

⑥スケジュール

3週毎に投与



Day1



Day2,3 デカドロン錠0.5mg 16錠/2×朝昼

①療法名 Cetu単独療法




②適応 大腸癌

③使用薬剤 アービタックス

④用量	アービタックス	初回のDAY1 400mg/m <sup>2</sup>
		以降250mg/m <sup>2</sup>

⑤スケジュール

1週間毎





- ①療法名 FOLFIRI+AFL療法  
 ②適応 大腸癌  
 ③使用薬剤 レボホリナート、イリノテカン、5-FU、ザルトラップ  
 ④用量

レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>
5-FU (急速静注)	400mg/m <sup>2</sup>
5-FU (持続静注)	2400mg/m <sup>2</sup>
ザルトラップ	4mg/kg

⑤スケジュール

2週毎に施行



①療法名 TAS-102(FTD/TPI)+BV療法

②適応 大腸癌


③使用薬剤 ロンサーフ、アバスチン

④用量	ロンサーフ	70mg/m <sup>2</sup>
	アバスチン	5mg/kg


⑤用法  
ロンサーフ:分2(PO)  
Day1~Day5内服、Day6、7休薬、  
Day8~Day12内服、Day13~28休薬

⑥スケジュール

2週毎に投与



Day1,15



①療法名 UFT+LV+BV療法

②適応 大腸癌

③使用薬剤 UFT、ユーゼル、アバスチン


④用量	UFT	300mg/m <sup>2</sup> /day
	LV	75mg/day
	アバスチン	5mg/kg

⑤用法 UFT、ユーゼル:分3(PO)


Day1夕～Day22昼内服、Day22夕～Day29昼休薬

⑥スケジュール

4週毎に投与



Day1,15







- ①療法名 SIRB療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 TS-1(20・25)、イリノテカン、アバスチン


④用量

アバスチン	7.5mg/kg
TS-1	40～60mg/回
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>


⑤用法 TS-1:分2(PO)

⑥スケジュール

TS-1:2週投薬1週休薬、イリノテカン、アバスチン3週毎に投与 3週で1クール



Day 1




- ①療法名 IRIS+VCT療法
- ②適応 大腸癌
- ③使用薬剤 TS-1(20・25)、イリノテカン、ベクティビックス

④用量	ベクティビックス	6mg/kg
	TS-1	40~60mg/回
	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>

⑤用法 TS-1:分2(PO)

⑥スケジュール

TS-1:2週投薬2週休薬 ベクティビックス・イリノテカン:2週毎 4週で1ク



Day 1,15

