

乳癌登録療法

	療法名	適応
1	PTX単独療法	乳癌
2	CAF療法	乳癌
3	EC療法	乳癌
4	AC療法	乳癌
5	TH療法	乳癌
6	FEC療法	乳癌
7	DTX療法	乳癌
8	アブラキサン単独療法(3週毎)	乳癌
9	アブラキサン単独療法(weekly)	乳癌
10	アブラキサンハーセプチン3週毎ハーセプチン毎週	乳癌
11	アブラキサン3週毎ハーセプチン3週毎	乳癌
12	GEM療法	乳癌
13	VNR療法	乳癌
14	VNR療法+ハーセプチン療法	乳癌
15	Tri-weeklyPTX療法	乳癌
16	エリブリン療法	乳癌
17	ハーセプチン療法(3週毎)	乳癌
18	PTX+BV療法	乳癌
19	CAP+ハーセプチン療法	乳癌
20	PER+HER+DTX療法	乳癌
21	TCH療法	乳癌
22	wPTX+wHER療法	乳癌
23	テセントリク+nab-PTX	乳癌
24	TC療法	乳癌
25	wPTX療法	乳癌

①療法名 PTX単独療法


②適応 乳癌

③使用薬剤 パクリタキセル

④用量 パクリタキセル 80mg/m²

⑤スケジュール

週1回、3週連続、1週休薬を1クールとして反復



① デカドロン 16.5mg、生食 20mL IV

② ガスター 20mg、生食20mL IV

③ レスタミンコーワ錠10mg 5錠 PO

④ パクリタキセル 80mg/m²
5%TZ 250mL
60min DIV

30分
後と
※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること

①療法名 CAF療法



②適応 乳癌

③使用薬剤 アドリアシン、エンドキサン、5-FU

④用量	アドリアシン	50mg/m ²
	エンドキサン	500mg/m ²
	5-FU	500mg/m ²

⑤スケジュール

3週に1回で計6回投与



①療法名 EC療法

②適応 乳癌


③使用薬剤 エピルビシン、エンドキサン

④用量 エピルビシン 90mg/m²

エンドキサン 600mg/m²

⑤スケジュール

3週に1回で計4回投与



① グラニセトロン又はアロキシバッグ 1P
デカドロン 6.6mg
15min IV

15分後
② エピルビシン 90mg/m²
生食 50mL/IV
15min

15分後
③ 生食 50mL/IV
全開 フラッシュ

40分後
④ エンドキサン 600mg/m²
生食 100mL/IV
60min

①療法名 AC療法


②適応 乳癌

③使用薬剤 アドリアシン、エンドキサン

④用量	アドリアシン	60mg/m ²
	エンドキサン	600mg/m ²

⑤スケジュール

3週に1回で計4回投与



①療法名 TH療法


②適応 乳癌

③使用薬剤 ハーセプチン、パクリタキセル


④用量	ハーセプチン(初回)	4mg/kg
	ハーセプチン(2回目以降)	2mg/kg
	パクリタキセル	80mg/m ²

⑤スケジュール


4週で1クール




① 0 90 105 135 (min)



② 0 90 105 135 (min)



③ 0 (min)



①療法名 FEC療法



②適応 乳癌

③使用薬剤 エピルビシン、エンドキサン、5-FU

④用量	エピルビシン	75mg/m ²
	エンドキサン	500mg/m ²
	5-FU	500mg/m ²

⑤スケジュール

3週に1回で計6回投与





①療法名 DTX療法

②適応 乳癌

③使用薬剤 ドセタキセル

④用量 ドセタキセル 60mg/m²

⑤スケジュール




①療法名 アブラキサン単独療法(3週毎)

②適応 乳癌

③使用薬剤 アブラキサン

④用量 アブラキサン 260mg/m²

⑤スケジュール



① グラニセトロン又はアロキシバグ
1P
デカドロン6.6mg 15min DIV

② アブラキサン 260mg/m²
生食 適量※ 30min DIV

15分
後 ※ アブラキサン100mg/V当たり生食20mLで懸濁後、
必要投与量のみ使用。希釈禁止。

①療法名 アブラキサン単独療法 (weekly)


②適応 乳癌

③使用薬剤 アブラキサン

④用量 アブラキサン $100\text{mg}/\text{m}^2$

⑤スケジュール

週1回、3週連続、2週休薬を1クールとして反復



① グラニセトロン又はアロキシバッグ
1P
デカドロン6. 6mg 15min DIV

② アブラキサン $100\text{mg}/\text{m}^2$
生食 適量※ 30min DIV

※ アブラキサン $100\text{mg}/\text{V}$ 当たり生食 20mL で懸濁後、
必要投与量のみ使用。希釈禁止。

15分
後

①療法名 アブラキサンハーセプチン3週毎ハーセプチン毎週


②適応 乳癌

③使用薬剤 ハーセプチン、アブラキサン


④用量	ハーセプチン(初回)	4mg/kg
	ハーセプチン(2回目以降)	2mg/kg
	アブラキサン	260mg/m ²

⑤スケジュール


3週で1クール




①



②



③



①療法名 アブラキサン3週毎ハーセプチン3週毎


②適応 乳癌

③使用薬剤 ハーセプチン、アブラキサン


④用量	ハーセプチン(初回)	8mg/kg
	ハーセプチン(2回目以降)	6mg/kg
	アブラキサン	260mg/m ²

⑤スケジュール


3週で1クール



①



②



①療法名 GEM療法

②適応 乳癌



③使用薬剤 ゲムシタビン

④用量

ゲムシタビン	1250mg/m ²
--------	-----------------------

⑤スケジュール

週1回、2週連続、1週休薬を1クールとして繰り返す。



①療法名 VNR単独療法

②適応 乳癌



③使用薬剤 ナベルビン

④用量

ナベルビン	25mg/m ²
-------	---------------------

⑤スケジュール

週1回、2週連続、1週休薬を1クールとして繰り返す。



①療法名 VNR+ハーセプチン療法

②適応 乳癌



③使用薬剤 ナベルビン、ハーセプチン

④用量	ナベルビン	25mg/m ²	… a
	ハーセプチン(初回)	4mg/kg	… b
	ハーセプチン(2回目以降)	2mg/kg	… c

⑤スケジュール

VNRは週1回、2週連続、1週休薬を1クールとして繰り返す。

ハーセプチンは毎週投与(初回投与は4mg/kg)



①療法名 Tri-weekly PTX 療法


②適応 乳癌

③使用薬剤 パクリタキセル

④用量 パクリタキセル 160~180mg/m²

⑤スケジュール

3週間毎に施行



① レスタミン錠10mg 5T P.O

② 生食 20mL
ガスター注20mg 1A IV

15分
後 ③ グラニセトロン又はアロキンバッグ 1P
デカドロン6.6mg 4V
15min IV

30分
後 ⑤ パクリタキセル 160~180mg/m²
生食 500mL
180min IV(レスタミン内服後30分あける)
※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること

210
分後 ⑥ 生食 20mL
フラッシュ用

①療法名 エリブリン療法

②適応 乳癌


③使用薬剤 ハラヴェン

④用量

ハラヴェン	1.4mg/m ²
-------	----------------------

⑤スケジュール

3週間毎に施行



①グラニセトロン又はアロキシバグ 1 P
デカドロン6.6mg 1V
15min IV

必要に応じて。省略可。

15分
後

③ハラヴェン 1.4mg/m²
生食 50mL
全開5min IV

5分
後

⑤生食 20mL
(フラッシュ用)

①療法名 ハーセプチン3週毎




②適応 乳癌

③使用薬剤 ハーセプチン

④用量	ハーセプチン(初回)	8mg/kg
	ハーセプチン(2回目以降)	6mg/kg

⑤スケジュール

3週で1クール





①療法名 PTX+BV療法

②適応 乳癌


③使用薬剤 パクリタキセル、アバスチン

④用量	パクリタキセル	90mg/m ²
	アバスチン	10mg/kg

⑤スケジュール



1. アバスチンは、初回は90分かけて投与し忍容性が良好であれば、2回目の投与時間は60分で行う。2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与時間は30分とする。



- ①療法名 CAP+ハーセプチン療法
- ②適応 乳癌
- ③使用薬剤 ハーセプチン、ゼローダ錠


④用量	ハーセプチン(初回)	4mg/kg
	ハーセプチン(2回目以降)	2mg/kg
	ゼローダ	1250mg/m ² (1800~3000mg/day)

⑤用法

ゼローダ	1日2回 経口投与(3週間内服、1週間休薬)
------	------------------------

⑥スケジュール

4週で1クール



①

① ハーセプチン 4mg/kg 生食 250mL 90min IV

②

① ハーセプチン 2mg/kg 生食 250mL 90min IV

①療法名 PER+HER+DTX療法


②適応 乳癌

③使用薬剤 パージェタ、ハーセプチン、ドセタキセル


④用量	パージェタ(初回)	840mg/body
	パージェタ(2回目以降)	420mg/body
	ハーセプチン(初回)	8mg/kg
	ハーセプチン(2回目以降)	6mg/kg
	ドセタキセル	75mg/m ²

⑤スケジュール


3週毎に施行



① (初回)



② (2回目以降)




* ②④はボラス投与可。

- ①療法名 TCH療法
- ②適応 乳癌
- ③使用薬剤 ドセタキセル、パラプラチン、ハーセプチン


④用量	ハーセプチン(初回)	8mg/kg
	ハーセプチン(2回目以降)	6mg/kg
	パラプラチン	targetAUC=6
	ドセタキセル	75mg/m ²

⑤スケジュール


3週毎に施行



① (初回)




② (2回目以降)



- ①療法名 wPTX +HER療法
- ②適応 乳癌
- ③使用薬剤 パクリタキセル、ハーセプチン
- ④用量

パクリタキセル	80mg/m ²
ハーセプチン(初回)	4mg/kg
ハーセプチン(2回目以降)	2mg/kg

毎週施行




	① レスタミン錠10mg 5T P.O
	② デカドロン 6.6mg ガスター 20mg 生食 100mL 30min IV
30分 後	③ グラニセトロン又はアロキシバッグ 1P 15min IV
45分 後	④ ハーセプチン 初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg 生食250mL IV 初回90min
135 分後	⑤ パクリタキセル 80mg/m ² 5%ブドウ糖注射液 250mL 90min IV(レスタミン内服後30分あける) ※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること
225 分後	⑥ 生食 50mL 全開

- ①療法名 テセントリク+nab-PTX療法
- ②適応 乳癌
- ③使用薬剤 テセントリク、アブラキサン
- ④用量 テセントリク 840mg/body
 アブラキサン 100mg/m²

⑤スケジュール

テセントリク2週毎、アブラキサン週1回、3週連続、1週休薬を1クールとして反復



① テセントリク 840mg
生食 250mL
IV 60min(2回目以降は30minに短縮可)
※インラインフィルター(0.2又は0.22 μ m)を使用すること

60分後 ② 生食 50mL
IV 15min

75分後 ③ グラニセトロン又はアロキシバッグ
1P
デカドロン6.6mg 15min DIV

90分後 ④ アブラキサン 100mg/m²
生食 適量※ 30min DIV
※ アブラキサン100mg/V当たり生食20mLで懸濁後、必要投与量のみ使用。希釈禁止。

①療法名 TC (DTX+CPA)療法

②適応 乳癌



③使用薬剤 ドセタキセル、エンドキサン

④用量 ドセタキセル 75mg/m²

エンドキサン 600mg/m²

⑤スケジュール

3週に1回で計4回投与



①療法名 wPTX療法 (AC followed by weekly PTX)


②適応 術前・術後乳癌

③使用薬剤 パクリタキセル

④用量 パクリタキセル 80mg/m²

⑤スケジュール

週1回ごと12コース投与



① レスタミン錠10mg 5T P.O

② デカドロン 6.6mg
ファモチジン 20mg
生食 100mL
30min IV

30分
後 ③ グラニセトロン又はアロキシバッグ 1P
15min IV

30分
後 ④ パクリタキセル 80mg/m²
5%TZ 250mL
60min DIV
※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること