

泌尿器科登録療法と適応

	療法名	適応
1	キイトルーダ療法	尿路上皮癌
2	PG療法	尿路上皮癌
3	パドセブ療法	尿路上皮癌
4	バベンチオ療法	尿路上皮癌

①療法名 キイトルーダ療法


②適応 尿路上皮癌

③使用薬剤 キイトルーダ

④用量 キイトルーダ 200mg/回

⑤スケジュール

3週間毎に施行




① キイトルーダ 200mg
生食 100mL
IV 30min

※インラインフィルター(0.2~5 μ m)を使用すること

- ①療法名 PTX+GEM療法
- ②適応 尿路上皮癌
- ③使用薬剤 パクリタキセル、ゲムシタビン
- ④用量

パクリタキセル	200mg/m ²
ゲムシタビン	1000mg/m ²

⑤スケジュール



①

①デカドロン 6.6mg
 ガスター 20mg
 生食 100mL
 30min IV
 レスタミン5T p.o

30分後 ② グラニセトロン又はアロキシバッグ 1P
 15min DIV

45分後 ③パクリタキセル 200mg/m²
 5%TZ 500mL
 180min DIV
 ※インラインフィルター(0.22ミクロン以下)を使用すること

225分後 ④ ゲムシタビン 1000mg/m²
 生食100mL 30min DIV

②

① グラニセトロン又はアロキシバッグ 1P
 デカドロン6.6mg 15min DIV

15分後 ④ ゲムシタビン 1000mg/m²
 生食100mL 30min DIV

①療法名 パドセブ療法


②適応 尿路上皮癌

③使用薬剤 パドセブ

④用量 パドセブ 1.25mg/kg

⑤スケジュール


4週で1クール



① パロノセトロン 1P
デカドロン注 6.6mg 1V
DIV 15min

② パドセブ点滴静注用 1.25mg/kg
生食 100mL
DIV 30min

- ①療法名 バベンチオ療法
②適応 尿路上皮癌
③使用薬剤と用量 バベンチオ 10mg/kg
④スケジュール 2週間1クール



⑤レジメン詳細

① アセトアミノフェン錠200mg 5T内服
② ポララミン注 5mg 生食 50mL 点滴 30min
③ バベンチオ 10mg/kg 生食 250mL 点滴 60min ※インラインフィルター(0.2~5 μ m)使用