

膵臓癌登録療法

	療法名	適応
1	GEM療法	膵癌
2	GEM+nab-PTX療法	膵癌
3	GEM+TS-1療法	膵癌
4	FOLFIRINOX療法	膵癌
5	オニバイド+1-LV+5-FU療法	膵癌
6	mFOLFOX6療法	膵癌

登録ナンバー:18

①療法名 GEM療法

②適応 膵癌


③使用薬剤 ゲムシタビン

④用量

ゲムシタビン	1000mg/m ²
--------	-----------------------

⑤スケジュール

週1回、3週連続、1週休薬を1クールとして繰り返す。



・高齢者では、800mg/m²程度より開始する。




① グラニセトロン又はアロキシバッグ 1P
デカドロン 3.3~6.6mg
15minIV (なくても可)

15分
後 ② ゲムシタビン 1000mg/m²
生食 100mL IV
30min

- ①療法名 GEM+nab-PTX療法
- ②適応 膵癌
- ③使用薬剤 アブラキサン、ゲムシタビン
- ④用量

アブラキサン	125mg/m ²
ゲムシタビン	1000mg/m ²

⑤スケジュール



Day 2~4、9~11、16~18

デカドロン錠0.5mg 16T/分2 朝・昼食後

①療法名 GEM+TS-1療法(術前)

②適応 膵癌

③使用薬剤 ゲムシタビン、TS-1(20・25)


④用量	ゲムシタビン	1000mg/m ²
	TS-1	80mg/m ²

TS-1:分2(PO)

14日間投与7日間休薬(Day1の夕食後より開始)

⑤スケジュール

週1回、2週連続、1週休薬を1クールとして2クール施行





- ①療法名 mFOLFIRINOX療法
 ②適応 膵癌
 ③使用薬剤 エルプラット、レボホリナート、イリノテカン、5-FU

④用量

エルプラット	85mg/m ²
レボホリナート	200mg/m ²
イリノテカン	150mg/m ²
5-FU (持続静注)	2400mg/m ²

⑤スケジュール

2週毎に施行



①療法名 オニバイド+1-LV+5-FU療法



②適応 膵癌

③使用薬剤 レボホリナート、オニバイド、5-FU

④用量	レボホリナート	200mg/m ²
	オニバイド	70mg/m ² (イリノテカンとして)
	5-FU (持続静注)	2400mg/m ²

⑤スケジュール

2週毎に施行



- ①療法名 mFOLFOX6療法
- ②適応 膵癌
- ③使用薬剤 エルプラット、レボホリナート、5-FU

④用量	エルプラット	85mg/m ²
	レボホリナート	200mg/m ²
	5-FU (急速静注)	400mg/m ³
	5-FU (持続静注)	2400mg/m ²

⑤スケジュール

2週毎に施行

